

Opalescence Quick 45% refill

Pret:

95,50 lei TVA inclusa



Descriere produs:

PROCEDURA PREMERGATOARE TRATAMENTULUI

1. Înainte de a incepe tratamentul de albire, medicul stomatolog trebuie să consulte pacientul și să se asigure de starea de sănătate a tesuturilor moi. Restaurările deficitare trebuie înlocuite, iar căriile trebuie obturate. Suprafetele radiculare expuse pot dezvolta sensibilitate. Dacă suprafetele expuse sunt mari, sau dacă restaurările sunt inadecvate, pacientul poate dezvolta durere (moderată pînă la severă). Uneori, aceasta problema poate fi rezolvată prin ajustarea gutierei, sau prin aplicarea unui agent bonding de calitate, ca de ex. PermaQuick.
2. Îndepărtați calculii și petele externe. Dacă tesutul este traumatizat, așteptați 1 pînă la 2 săptămâni înainte de a incepe tratamentul de albire pentru a reduce posibila sensibilitate gingivală.
3. După încheierea tratamentului de albire, așteptați 2 săptămâni pînă la plasarea restaurațiilor- aceasta din 2 motive :a) rezistența bondingului poate fi semnificativ redusă de reziduurile de peroxid (oxigen) din dentina sau smalt.b) stabilizarea culorii necesită timp, lucru important pentru plasarea restaurațiilor definitive .
4. Ocazional, în gutiera se poate observa o colorație rosie moderată, în vecinătatea obturărilor de amalgam (care contin Zn). Experiența a dovedit că această colorație este lipsită de importanță.

5. Dintii cu restaurari mari de amalgam, pot aparea mai inchisi la culoare datorita faptului ca amalgamul devine mai vizibil prin smaltul albit. Aceste dinti pot necesita restaurari estetice dupa incheierea tratamentului de albire

6. Unele pete nu raspund la tratamentul de albire. De asemenea, se poate intampla ca dupa scurt timp, unele pete care au fost indepartate, sa reapara. Acest lucru indica faptul ca dintii nu au fost receptivi la actiunea peroxidului si ca «albirea initiala» s-a datorat deshidratarii smaltului care si-a revenit apoi la culoarea initiala dupa ce dintii s-au rehidratat. In cazul petelor intrinseci dificile, treimea gingivala a dintelui se va albi ceva mai incet si mai putin decat celelalte doua treimi.

7. Daca medicul stomatolog banuieste ca pacientul ar putea inghiti gutiera, tratamentul trebuie evitat.

8. Cind gutiera nu este utilizata, trebuie pastrata in cutiuta ei.

9. Dintii devitali pot fi albiti rapid prin deschiderea accesului lingual al dintelui. Pacientului i se da o seringa cu Opalescence si un dispozitiv Black Micro Tip si e invatat sa-si irige deschiderea linguala cu apa, apoi s-o umple cu Opalescence Quick. Apoi se incarca si se introduce gutiera in cavitatea bucală. Evaluati periodic procesul, deoarece dintii devitali se pot albi semnificativ mai rapid decat cei vitali.

PROCEDURA

1. Pentru a accelera efectul gelului, incalziti seringa in prealabil. Tineti seringa sub jet de apa calda timp de 2-3 minute. Temperatura gelului nu trebuie sa fie prea mare, pentru a nu leza tesuturile moi. Testati temperatura gelului inainte de a insera gutiera, pentru a evita posibila lezare a tesutului.

2. Confectionati gutiera respectand instructiunile.

3. Durata tratamentului poate varia de la pacient la pacient. Fiecare sedinta de tratament trebuie sa dureze intre 30 minute si 2 ore. Daca intentionati sa efectuati tratamentul cu Opalescence Quick, ca un initiator al tratamentului urmat acasa de catre pacient, atunci este necesara doar o sedinta in cabinetul stomatologic, dupa care pacientul poate merge acasa cu Opalescence 10% carbamid peroxid.

4. Ocasional, sensibilitatea poate necesita tratament. Tehnicile citate in literatura si care pot fi eficace, sunt:

a) pacientul va purta gutiera incarcata cu un gel neutru viscos, ce contine nitrat de potasiu (UltraEz).

b) administrarea unor medicamente analgezice-antiinflamatorii ca de ex. ibuprofen sau aspirina.

ATENTIE

1) Cititi cu atentie toate instructiunile. Acordati mare atentie designului gutierei si planificati tratamentul astfel incat sa asigurati si mentineti confortul pacientului.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 2) Starea de sanatate a cavitatii bucale trebuie sa fie foarte buna.
- 3) Desi nu au fost evidențiate probleme, ca o masura de precautie, Opalescence Quick nu trebuie folosit în timpul sarcinii.
- 4) Există unele date care indic faptul că peroxizii potențează acțiunea unor agenți carcinogeni. Ca o masură de precautie, pacienții care sunt fumatori sau consumatori de alcool, trebuie să intrerupă fumatul și consumul alcoolului în timpul tratamentului de albire.
- 5) Dacă pacientul prezintă alergie sau sensibilitate chimică la peroxizi, carbopol, glicerina etc., nu trebuie să urmeze tratamentul de albire cu Opalescence Quick.
- 6) Înainte de introducerea gutierei în cavitatea bucală, dintii trebuie curatați.
- 7) Restaurările trebuie sigilate corect, iar toate suprafetele dentinare expuse existente, trebuie acoperite. Dacă pacientul prezintă antecedente de sensibilitate, trebuie realizată o restaurare adecvată, cu un agent bonding, etc, sau temporar, cu un sigilant de dentina.
- 8) Pot exista arii de decalcificare care nu sunt vizibile cu ochiul liber. Zonele de decalcificare se vor albi mai rapid, devenind mai evidente în timpul procesului de albire. Continuați tratamentul pînă ce și restul suprafetei dintelui ajunge la aceeași culoare. Reevaluați situația la 2 săptămâni după încheierea tratamentului de albire, cînd culoarea s-a stabilizat.
- 9) Dacă pacientul dezvoltă sensibilitate, gutiera trebuie îndepărtată. Dacă problema persistă, intrerupeti tratamentul.
- 10) Informați pacientii asupra faptului că obturăriile și coroanele existente nu se vor albi.
- 11) Monitorizați cu atenție tratamentul pentru a preveni albirea dintilor pînă la gradul de transluciditate.
- 12) Opalescence Quick este livrat în seringi de 1,2 cc, gata încarcate. Substanța nu trebuie injectată.
- 13) Produsul trebuie pastrat la frigider. Feriti-l de acțiunea caldurii și de lumina soarelui.
- 14) Dacă disconfortul gingival sau dentar persistă (ca de ex o sensibilitate excesivă la rece), invătați pacientul să-si scoată gutiera, să intrerupa tratamentul și să contacteze medicul stomatolog.**
- 15) Pacienții cu bruxism pronuntat sau cu ocluzii problematice, pot necesita un material de gutiera de grosime mai mare.
- 16) Cînd este pusă la frigider, seringa poate capăta un aspect inghetat. Dacă e lăsată la temperatură camerei, aspectul seringii va reveni la normal. Acest lucru nu afectează eficacitatea produsului.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

- 1 x seringa 1,2 ml + varf aplicare